

Gegevens patiënt	Gegevens arts
Naam patiënt:	Naam arts:
Geboortedatum patiënt:	Plaats arts:
Adres:	Email voor receptaanvragen:
Postcode + plaats:	
BSN:	
Telefoonnummer en mailadres: (belangrijk)	
Apotheek waar patiënt is ingeschreven:	<i>Op deze plaats kan eventueel een sticker met patiëntgegevens worden geplakt.</i>

Bestelling			
	Dosering	Inhoud	Leveren per 3 maanden, gedurende 3 jaar vanaf datum:
ACARIZAX 12 SQ-HDM LYOFILISAAT	1 x per dag 1 tablet	90st	
ACTAIR 300IR	1 x per dag 1 tablet	90st	
GRAZAX 75.000 SQ-T LYOFILISAAT	1 x per dag 1 tablet	100st	
ORALAIR 300IR	1 x per dag 1 tablet	90st	
ITULAZAX 12 SQ-BET LYOFILISAAT	1x per dag 1 tablet	90st	

*"stop" noteren bij desbetreffende gnm, indien medicatie is gestopt

Toestemming patiënt Recept/ formulier wordt naar info@daoweb.nl (Dienstapothek Arnhem) gestuurd en deze stuurt het recept door naar de apotheek waar u bent ingeschreven. Mocht de betreffende apotheek niet deelnemen aan het begeleidingsprogramma dan wordt er met u contact opgenomen welke apotheek het recept moet worden gestuurd. Handtekening patiënt: Datum: / /

Handtekening arts: Datum: / /
Bestelformulier sturen naar info@daoweb.nl

Begeleidingsmomenten:

- Moment 1: (poli-apotheek) Eerste uitgifte begeleiding.
 - Uitleg gebruik, inname instructie, uitleg bijwerkingen en wat eraan te doen, uitleg vervolgleveringen, belang therapietrouw
- Moment 2: Aantal dagen na start **2-5 dagen**. Bijwerkingen, Intake herhaalservice, Vragen, **patiënt labels ZI-code 14963698: "patient labelen als deelnemer project 4"**
- Moment 3: Tweede uitgifte: vlak voor tweede levering (na levering poli-apotheek)
 - Begeleiding gebruik, vragen
- Moment 4: Derde uitgifte: circa 1 tot 2 weken voor volgende levering van drie maanden (ongeveer 14 a 15 weken na start)
 - Begeleiding gebruik, vragen
- Moment 5 en 6: Jaarlijks evalueren
 - Begeleiding gebruik, vragen

Intake HHS

1. Afspraak volgende levering
2. Benadruk het gemak en stukje ontzorgen voor volgende levering.
3. Afspraak bezorging/ afhalen/ kluis
4. Check email /06 nummer

Bijwerkingen

1. Zwelling in de mond, Jeuk in mond of oor, Irriterend gevoel in de keel, niet lekker voelen , last van keel, maag darm klachten. Kortademigheid, hoesten of niezen, Onaangenaam gevoel op de borst. Vele bijwerkingen zijn vooral in het begin van de behandeling aanwezig! Voor alle bijwerkingen check de productinformatie.
2. Jeuk in de mond, tintelingen en of prikkelingen in de mond hoort erbij, is een teken dat het werkt. Eventuele adviezen:
 - ijsblokjes in de mond, na 5 minuten.
 - Advies om uur van te voren een anti-histaminicum te nemen is vervallen uit richtlijn.
3. Moeite met slikken, ademhalen of zwelling keel: terugverwijzen naar voorschrijver.

Begeleiding gebruik

1. Check doel behandeling. Na drie jaar is de oorzaak aangepakt en zullen diverse klachten worden aangepakt. lichamelijke klachten, vermoeidheid. Maar ook werkverzuim, effect op relaties, frustratie/ irritatie.
2. Bespreek verwachtingen patiënt en de persoonlijke doelstellingen
3. Bespreek therapietrouw: heeft de patiënt nog meer ondersteuning nodig? Zijn alle tabletten op. Medicijn wekker eventueel via Med Gemak app.
4. Bespreek inname:
 - Droge handen tablet uit strip halen, niet door folie heen drukken, dan breekt tablet
 - Adviseer vast tijdstip van inname (mag elk moment van de dag zijn). Bij meerdere SLIT verdelen over de dag
 - Onder de tong
 - 5 minuten na inname niet eten of drinken
 - Vergeten tablet: alsnog innemen zelfde dag

Vragen

1. Vraag altijd na of er vragen zijn.
2. Bespreek bij wie ze moeten zijn voor eventuele vragen. Naam assistente/ apotheker.

Stoppen

Is een patiënt echt gestopt met de behandeling, dan geeft de apotheek dit door aan de behandelaar.