

Checklist bij problemen voor GLP1 injectie-instructies**CAA/Rijnstate/Vitalys**

Maart 2026: liraglutide (Vobexoryn, Diavorin, Nevolat, Saxenda)

Stap	Actie
1	Controleer de spuitinstructie: als de injecteerknop stroef gaat, niet te hard op de huid duwen.
2	Adviseer om bij elke toediening een nieuw naaldje te gebruiken.
3	Bij een pijnlijke injectie: overweeg de injectieplaats 10 minuten van tevoren te koelen.
4	Wissel de injectieplaatsen goed af (benen en buik, links en rechts) zodat de huid kan herstellen.
5	Let erop dat de juiste naalden worden bijgeleverd (zie bijsluiter). Injectienaalden worden niet bij de pen geleverd. Er kunnen bijvoorbeeld BD Ultra-Fine™ wegwerpnaalden of NovoFine® wegwerpnaalden met een dikte van 32 G en lengte tot 8 mm worden gebruikt.
6	Moedig patiënten met klachten aan om dit te melden bij het "meldpunt medicijnen" voor landelijke registratie.
7	Instructie gegeven?: Declareer prestatie 70001 (instructie UR-gerelateerd hulpmiddel) en noteer in dossier (EPD)
8	Declareer prestatie 71014 (farmaceutisch consult bij zorgvraag patiënt) en noteer in dossier (EPD)